



ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier un prélèvement sanguin d'hyperglycémie
provoquée

ACTIVITÉS RÉSERVÉES OU PARTAGÉES

Infirmières

- Evaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique
- Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance

PROFESSIONNELS VISÉS

Personnel infirmier du Centre de santé et services sociaux de Laval (CSSSL) exerçant au GMF Le Carrefour médical.

RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE

Oui Non

Si oui, lequel : Protocole interdisciplinaire pour le suivi de clientèle diabétique en GMF.

CLIENTÈLE VISÉE

Tout usager inscrit au GMF Le Carrefour médical qui bénéficie d'un suivi infirmier.

INTENTIONS THÉRAPEUTIQUES

- Instaurer un dépistage précoce du diabète
- Assurer un traitement adapté à la situation de santé vécue par l'usager
- Diminuer les risques de développer des complications à long terme reliées au diabète.

CONTRE-INDICATIONS

- Patient connu diabétique et /ou traité par antidiabétiques oraux ou insuline.
- Présence de résultats de test de laboratoire au dossier confirmant déjà un diagnostic de diabète tel :
 - que glycémie à jeun ≥ 7.1 mmol/L
 - HGOP (75g non grossesse) confirmant déjà le diagnostic de diabète

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-006
RÉVISÉE LE :	PAGE : 1	DE : 5

CONDITIONS D'INITIATION (toutes les conditions s'appliquent)

- Usager n'ayant aucun résultat d'hyperglycémie provoquée à son dossier

- Usager ayant au dossier, l'un des deux résultats suivants :
 - Glycémie veineuse à jeun entre 6.1 et 6.9 mmol/L.
 - Glycémie veineuse à jeun entre 5.7 et 6.9 mmol/L associée à un facteur de risque de diabète, selon le tableau 1, ci-dessous.

Tableau 1

Facteurs de risques de diabète
≥40ans
Parent de premier degré diabétique de type 2
Membre d'une population à risque (autochtone, hispanique, asiatique, sud-asiatique, africaine)
Antécédent d'intolérance ou d'anomalie de la glycémie à jeun
Présence de complications associées au diabète
Antécédent de diabète gestationnel
Bébé de poids élevé à la naissance (> 4 Kg)
Hypertension artérielle
Dyslipidémie
Surcharge pondérale (IMC > 27)
Obésité tronculaire (Homme > 102 cm, femme > 88 cm)
Syndrome des ovaires polykystiques
Acanthosis nigricans
Schizophrénie
Origine médicamenteuse (voir annexe pour détails)

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-006
RÉVISÉE LE :	PAGE : 2	DE : 5



ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier un prélèvement sanguin d'hyperglycémie provoquée

DIRECTIVES

- Rencontrer l'utilisateur suite à une référence du médecin traitant.
- Vérifier si la situation de l'utilisateur correspond aux conditions de l'ordonnance collective. Dans l'affirmative, initier l'examen suivant :
 - **Hyperglycémie provoquée (75g. glucides/2 heures).**
- Compléter la requête de laboratoire appropriée, en spécifiant d'acheminer une copie des résultats au médecin traitant et diriger l'utilisateur vers le centre de prélèvements de son choix.
- Assurer le suivi infirmier selon les algorithmes de suivi de la clientèle hypertendue en vigueur au GMF.

RÉFÉRENCES

- Association canadienne du diabète. (2008). Lignes directrices de pratique clinique 2008 de l'Association canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du diabète au Canada. *Canadian Journal of Diabetes*, 32, suppl.1.
- GMF Centre médical Laval. Ordonnance collective OC GMF/CML-001. Initier un prélèvement d'hyperglycémie provoquée, 2008.
- Mémoire, Juin 2011, Senécal P., Long H. Prescription des hyperglycémies provoquées (HGOP) 75 g non de grossesse.

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-006
RÉVISÉE LE :	PAGE : 3	DE : 5

PERSONNES ET/OU INSTANCES CONSULTÉES

Membres du Comité harmonisation de la pratique en GMF

- Dre Sophie Major, médecin
- Dr Gilles Lalonde, médecin
- Julie Rousseau, pharmacienne
- Maya Abbas, coordonnatrice accès-liaison, DSGFCL
- Estelle Lafortune, chef de service fonction coordination liaison, DSGFCL
- Marie-Noel Lachambre, infirmière clinicienne

RÉDIGÉ PAR

Martin Desaulniers,
Infirmier clinicien

2011-06-10

Date

Marie-France Dubois,
Conseillère cadre services généraux et
soins infirmiers de 1^{ère} ligne

2011-06-10

Date

RECOMMANDÉ PAR

Comité aviseur des outils cliniques
DSI

2011-06-27

Date

Comité harmonisation de la pratique
en GMF

2011-09-15











Date

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-006
RÉVISÉE LE :	PAGE : 4	DE : 5

ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier un prélèvement sanguin d'hyperglycémie
provoquée

APPROUVÉ PAR

Stéphanie Kocherburger Bélonjeu		11-10-11
	Signature	Date
Maurice Pilon		11-10-11
	Signature	Date
Pierre Proulx		13-10-11
	Signature	Date
Pierre A Gauthier		2011-10-14
	Signature	Date
LOUISE F. GAUTHIER		2011-10-18
	Signature	Date
Michèle Proulx		2011-10-18
	Signature	Date
MEACHER SUZY		2011-11-04
	Signature	Date
Colette Paquin		2011-11-07
	Signature	Date
PROVENCEN FRANCE		2011/11/28
	Signature	Date
MICHEL TARDIF		2011/11/28
	Signature	Date
	Signature	Date
	Signature	Date

EN VIGUEUR LE :

DATE PRÉVUE DE RÉVISION :

N° : OC-GMF/CM-006

RÉVISÉE LE :

PAGE : 5 DE : 5